Übersicht

1. Rechengesetze
2. Elementare Gleichungen
3. Anordnung und Betrag
4. Potenzen
5. Quadratische Gleichungen
6. Wurzelgleichungen
7. Gleichungen n-ten Grades
8. Logarithmen
9. Lineare Gleichungssysteme
10. Funktionen
11. Ungleichungen
12. Elementargeometrie
13. **Vektoren – Grundbegriffe**
14. Ableitung – Grundbegriffe
15. Integral – Grundbegriffe

**Hochschule
Flensburg**
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**
Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13. Vektoren – Grundbegriffe

**Hochschule
Flensburg**
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$

Definition – Koordinaten

- **Vektoren** – Objekte mit einer vorgegebenen **Länge** und **Richtung**; $\vec{a}$
- $|\vec{v}|$ ist **Betrag** des Vektors $\vec{v}$.
- **Anwendung:** Darstellung der physikalischen Kräfte wie Geschwindigkeit oder Strömungsrichtungen im Raum;
- **Vektoren** – Parallelverschiebungen von Elementen
 - wir verschieben den Punkt P_1 um $\vec{v}_1$ Einheiten in x -Richtung und $\vec{v}_2$ Einheiten in y -Richtung.
 - P_1P_2 – ein **Verschiebungspfeil**
 - Parallelverschiebung eines Dreiecks um den Vektor $\vec{v}$
 - Schreibweise – **Zahlenspalte (Koordinaten eines Vektors):**

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \mathcal{V}$$

- Ermitteln von Vektoren: „Spitze minus Schaft“

$$\vec{v} = \overrightarrow{AA'} = \begin{pmatrix} A'_x - A_x \\ A'_y - A_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - (-6) \\ 2 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$

Begriffe

- **Nullvektor** – Vektor der Länge Null $\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, d. h. $|\vec{0}| = 0$
- Zwei Vektoren sind **gleich**, wenn ihre Koordinaten übereinstimmen, d.h.
 - gleiche Länge = Betrag
 - gleiche Richtung
- **Ortsvektor** (Koordinatenvektor, Zeiger, „gebundener Vektor“)
 - Gegeben Punkt (3|2)
 - $\vec{OP}$ – Pfeil zum Punkt P vom Ursprung O
 - Legen wir fest, dass die Zahlenspalte $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ nur durch den Pfeil $\vec{OP}$ dargestellt wird (und nicht durch andere verschiebungsgleiche zu $\vec{OP}$), dann nennt man $\vec{OP}$ ein **Ortsvektor**.
 - Die Koordinaten des Ortsvektors $\vec{OP}$ sind einfach die **Koordinaten des Punktes P**
 - Andere Schreibweise: $\vec{OP} = \vec{r}(P) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$
 - **Beispiel:** Ortsvektoren der Bahnkurve eines schief nach oben geworfenen Körpers

$$\vec{OP} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$

Ortsvektor eines Punktes

■ Ortsvektor eines Punktes - Aufgabe

Eine Verschiebung ist durch den Vektor $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ bestimmt, wobei $A(2|4)$ und $B(5|1)$ ist. Für welchen Punkt ist $\vec{a}$ Ortsvektor?

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 5-2 \\ 1-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Ortsvektor zum Punkt } P(3|-3)$$

„Spitze minus Schaft“

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

Innovative
Hochschule

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

Lösung: $P(3|-3)$

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$

Rechnen mit Vektoren – Addition und Subtraktion

■ **Addition**

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$$

Summe einer geschlossenen Vektorkette ist gleich $\vec{0}$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$

Rechnen mit Vektoren – Addition und Subtraktion

■ Addition

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

Summe einer geschlossenen Vektorkette ist gleich $\vec{0}$

■ Subtraktion

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{c}$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ y_1 - y_2 \end{pmatrix}$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$

Rechnen mit Vektoren – Multiplikation mit einem Skalar

- Vielfaches - Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar k :

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{c} = k \cdot \vec{a} = k \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cdot x_1 \\ k \cdot y_1 \end{pmatrix}$$

$$3 \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} 3a_x \\ 3a_y \end{pmatrix}$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$

Rechnen mit Vektoren – Betrag

- **Betrag:**

Ist $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$, so heißt $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$ **Betrag** oder **Länge von $\vec{a}$** .

Der Betrag von $\vec{a}$ wird auch mit a bezeichnet.

- Der **Betrag** eines Vektors ist – geometrisch veranschaulicht – gleich (dem Zahlenwert) der Länge eines Pfeiles, der den Vektor darstellt.
- Die Formel für Betrag lässt sich aus dem Pythagoras-Satzes ableiten:

$$|\vec{a}| = a = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$$

- **Beispiel:** Berechnen Sie die Länge des Vektors $\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Lösung: $|\vec{v}| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$

$$\vec{F}, \quad F = 100 \text{ N} = |\vec{F}|$$

$$\|\vec{x}\| = |\vec{x}| = x$$

Andere Bezeichnung für Betrag
„**Norm eines Vektors**“:

$$\|\vec{x}\|$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$

Rechnen mit Vektoren – Skalarprodukt

- **Skalarprodukt (inneres Produkt):**

- **Multiplikation zweier Vektoren**

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$$

- Das Ergebnis ist ein Skalar (reelle Zahl), **kein Vektor!**
Vektor „mal“ Vektor = Skalar

Skalarprodukte zweier Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \phi = a_x b_x + a_y b_y$$

Wobei ϕ der von beiden Vektoren eingeschlossene Winkel $0^\circ \leq \phi \leq 180^\circ$ ist.

- **Bemerkung:** ϕ ist der kleinere der beiden Winkel, den $\vec{a}$ und $\vec{b}$ bei **gleichem Fußpunkt** miteinander bilden.

- **Anwendung:** Arbeit in der Mechanik ist **Skalarprodukt von Kraft und Weg.**

- Aus der Formel ergibt sich die Berechnung vom Winkel:

$$\cos \phi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$

Rechnen mit Vektoren – Skalarprodukt

- Skalarprodukt - Spezialfälle:

Rechter Winkel: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos 90^\circ = 0$

Parallele Vektoren: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a \cdot b \Rightarrow \cos \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 0^\circ$

Entgegengesetzte Vektoren: $\vec{a} \cdot \vec{b} = -a \cdot b \Rightarrow \cos \alpha = -1 \Rightarrow \alpha = 180^\circ$

Gleiche Vektoren: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a \cdot b \cdot \cos 0^\circ = a^2$

- Rechengesetze

Assoziatives Gesetz: Ist ungültig: $\vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c}) \neq (\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}$

Kommutatives Gesetz: Ist gültig: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ ✓

Distributives Gesetz: Ist gültig: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ ✓

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$

Rechnen mit Vektoren – Skalarprodukt

■ Skalarprodukt - Beispiele:

a) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$; $\vec{a} \cdot \vec{b} = ?$

b) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_x \\ -1 \end{pmatrix}$; berechne b_x so, dass $\vec{a} \perp \vec{b}$.

a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot (-2) + 2 \cdot 4 = -6 + 8 = \underline{\underline{2}}$

b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$

$$2b_x + 4 \cdot (-1) = 0$$

$$2b_x - 4 = 0 \quad | \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow b_x - 2 = 0 \quad | +2 \Rightarrow b_x = 2$$

$$b_x = 2$$

Lösung

Zu a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot (-2) + 2 \cdot 4 = 2$.

Zu b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot b_x - 4 = 0 \Rightarrow b_x = 2$.

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$

Rechnen mit Vektoren – Skalarprodukt

- Skalarprodukt – Winkel zwischen zwei Vektoren:

Welche Winkel schließt der Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ mit den beiden Koordinatenachsen ein?

Lösung:

Die gesuchten Winkel α und β sind gerade die Winkel, die der Vektor $\vec{a}$ mit $\vec{i}$ bzw. $\vec{j}$ einschließt.

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{i}}{|\vec{a}| \cdot 1} = \frac{-2 \cdot 1 + 1 \cdot 0}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2}} = -\frac{2}{\sqrt{5}};$$

$$\cos \beta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{j}}{|\vec{a}| \cdot 1} = \frac{-2 \cdot 0 + 1 \cdot 1}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\Rightarrow \alpha = \arccos\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) = 153,4^\circ, \quad \beta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) = 63,4^\circ.$$

$$\vec{e}_x = \vec{e}_1 = \vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow |\vec{i}| = \sqrt{1^2 + 0} = 1$$

„Einheitsvektor Richtung x-Achse“

$$\vec{e}_y = \vec{e}_2 = \vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow |\vec{j}| = 1 \text{ „-“ } y\text{-Achse“}$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$ Eigenschaften in $\mathbb{R}^2$

- **Kollineare Vektoren** (Parallel, anti-parallel oder auf gleicher Gerade)
 - Algebraisch ausgedrückt: **linear abhängig** ($\vec{b} = \lambda \vec{a}$)
- **Koplanare Vektoren** – Vektoren, welche alle auf der gleichen Fläche liegen.
 - Algebraisch ausgedrückt: **lineare Kombination** ($\vec{w} = \lambda \vec{u} + \mu \vec{v}$) $\mathbb{R}^3$
- **Inverser Vektor** (Gegenvektor) zu einem Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$:
 - $-\vec{a} = -\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_x \\ -a_y \end{pmatrix}$
- **Normalvektor** (Normalenvektor) $\vec{n}$ zu einem Vektor $\vec{a}$ – ein Vektor, der orthogonal (d. h. rechtwinklig, senkrecht) auf dem Vektor $\vec{a}$ steht ($\vec{n} \perp \vec{a}$) und gleiche Länge wie Vektor $\vec{a}$ hat.
 - Es gibt zwei Normalvektoren zu einem Vektor $\vec{a}$ (in $\mathbb{R}^2$)
 - $\vec{n}$ und $-\vec{n}$ erhält man durch Vertauschen der Koordinaten von $\vec{a}$ und Wechsel des Vorzeichens bei einer der beiden Koordinaten:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} -a_y \\ a_x \end{pmatrix} \text{ und } -\vec{n} = \begin{pmatrix} a_y \\ -a_x \end{pmatrix}$$

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$ Eigenschaften in $\mathbb{R}^2$

- Einheitsvektor $\vec{a}_0$ (normierter Vektor) – Vektor mit der Länge 1: $\vec{a}_0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{a}_0 = \frac{1}{\sqrt{29}} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{29}} \\ \frac{5}{\sqrt{29}} \end{pmatrix}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}$$

- Komponentendarstellung eines Vektors in $\mathbb{R}^2$

- Einheitsvektoren in Richtung Koordinatenachsen:

$$\vec{i} = \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ in Richtung } x\text{-Achse}$$

$$\vec{j} = \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ in Richtung } y\text{-Achse}$$

- Jeder Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$ kann in Richtung der beiden Koordinatenachsen zerlegt werden:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} = a_x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_y \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} = a_x \cdot \vec{e}_1 + a_y \cdot \vec{e}_2$$

- Vektorkomponenten: $a_x \cdot \vec{i}$ und $a_y \cdot \vec{j}$

- Vektorkoordinaten (skalare Komponenten): a_x und a_y

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \underbrace{2}_{a_x} \cdot \vec{e}_x + \underbrace{5}_{a_y} \cdot \vec{e}_y$$

Vektorkomponente

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$ Eigenschaften in $\mathbb{R}^2$

- **Einheitsvektoren als Richtungsvektoren (normierter Vektor)**
 - Vektoren werden oft verwendet, um Richtungen anzugeben.
 - Dabei ist der Betrag eines solchen Richtungsvektors meist ohne Bedeutung.
 - Fallweise ist das aber günstig, statt des Vektors $\vec{a}$ den entsprechenden Einheitsvektor $\vec{a}_0$ zu verwenden.
 - Der folgende Satz stellt eine Beziehung zwischen $\vec{a}$ und $\vec{a}_0$ her:

$$\text{Ist } \vec{a} \neq \vec{0}, \text{ so gilt für den Einheitsvektor } \vec{a}_0: \vec{a}_0 = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a}$$

Beispiel:

a) Wie lauten die Koordinaten des Einheitsvektors $\vec{a}_0$ von $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$?

Lösung: $|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \Rightarrow \vec{a}_0 = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,89 \\ 0,45 \end{pmatrix}$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

Innovative
Hochschule

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.1 Vektoren in $\mathbb{R}^2$

Eigenschaften in $\mathbb{R}^2$

Ist $\vec{a} \neq \vec{0}$, so gilt für den Einheitsvektor $\vec{a}_0$: $\vec{a}_0 = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a}$

Beispiel:

- b) Gegeben ist die Strecke AB durch $A(1|5)$ und $B(4|4)$. Verdoppeln Sie die Länge der Strecke AB über B hinaus. Wie lauten die Koordinaten des Endpunktes C ?

Lösung: $\vec{OC} = \vec{OA} + 2 \cdot \vec{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow C(7|3)$

- c) Verlängern Sie die Strecke AB über B hinaus um 4 Längeneinheiten. Wie lauten nun die Koordinaten des Endpunktes D ?

Wir müssen von B aus das Vierfache des Einheitsvektors von

$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 4 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ abtragen.

Der Einheitsvektor von $\vec{AB}$ ist wegen: $|\vec{AB}| = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$ der Vektor $\frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

$\vec{BD} = 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

Damit: $\vec{OD} = \vec{OB} + \vec{BD} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} + 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 7,8 \\ 2,7 \end{pmatrix}$

→ Also $D(7,8|2,7)$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

ISBN: [9783705501553](https://www.isbn-international.org/product/9783705501553)

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Vektoren im Koordinatensystem

Ortsvektor:

$$\vec{r} = \overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**
Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Vektoren im Koordinatensystem

Ortsvektor:

$$\vec{r} = \overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z$$

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2,5 \end{pmatrix} = 5 \cdot \vec{e}_1 + 3 \cdot \vec{e}_2 + 2,5 \vec{e}_3 \\ &= 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**
Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Rechnen mit Vektoren

Alle Rechengesetze für Vektoren in der Ebene ($\mathbb{R}^2$) gelten auch für Vektoren im Raum ($\mathbb{R}^3$):

1. Addition:

Zwei Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ werden komponentenweise addiert:

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + a_3 \end{pmatrix}$$

2. Subtraktion:

Zwei Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ werden komponentenweise subtrahiert:

$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \\ a_3 - b_3 \end{pmatrix}$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Rechnen mit Vektoren

Alle Rechengesetze für Vektoren in der Ebene ($\mathbb{R}^2$) gelten auch für Vektoren im Raum ($\mathbb{R}^3$):

3. Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar λ :

$$\lambda \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} \lambda \cdot v_1 \\ \lambda \cdot v_2 \\ \lambda \cdot v_3 \end{pmatrix}$$

4. Betrag $\|\vec{v}\|$ eines Vektors:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Rechnen mit Vektoren

Alle Rechengesetze für Vektoren in der Ebene ($\mathbb{R}^2$) gelten auch für Vektoren im Raum ($\mathbb{R}^3$):

5. Skalarprodukt zweier Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$:

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3 \\ &= \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\| \cdot \cos \alpha\end{aligned}$$

6. Winkel α zwischen zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$:

$$\alpha = \arccos \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\|} \right)$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Rechnen mit Vektoren

Speziell im Raum ($\mathbb{R}^3$) !!!

7. Kreuzprodukt zweier Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Kreuzprodukt

- Das **Kreuzprodukt** (oder Vektorprodukt oder Äußeres Produkt) ist **nur** im $\mathbb{R}^3$ definiert.
- Kreuzprodukt $\neq$ Skalarprodukt
- Kreuzprodukt: Vektor „mal“ Vektor = **Vektor**
- Skalarprodukt: Vektor „mal“ Vektor = **Skalar**

Seien $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$. Dann heißt der Vektor

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

Kreuzprodukt oder **Vektorprodukt** von $\vec{a}$ und $\vec{b}$.

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Kreuzprodukt

Das **Kreuzprodukt** $\vec{a} \times \vec{b}$ liefert einen Vektor $\vec{c}$ mit folgenden Eigenschaften.

1. $\vec{c}$ steht **senkrecht** auf $\vec{a}$ und auf $\vec{b}$: $\vec{c} \perp \vec{a} \wedge \vec{c} \perp \vec{b}$
2. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ bilden in dieser Reihenfolge ein "rechte Hand-System"

$$\vec{c} \cdot \vec{a} = 0 \text{ und } \vec{c} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{a}$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Kreuzprodukt

Das **Kreuzprodukt** $\vec{a} \times \vec{b}$ liefert einen Vektor $\vec{c}$ mit folgenden Eigenschaften.

1. $\vec{c}$ steht **senkrecht** auf $\vec{a}$ und auf $\vec{b}$: $\vec{c} \perp \vec{a} \wedge \vec{c} \perp \vec{b}$
2. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ bilden in dieser Reihenfolge ein "rechte Hand-System"
3. $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$, wobei φ der zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ eingeschlossene Winkel ist.

Das entspricht gerade der **Fläche des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms**.

Die Länge des Vektors $\vec{c}$, $|\vec{c}| = |\vec{a} \times \vec{b}|$ entspricht dem Flächeninhalt A des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms.

$$\vec{c} \cdot \vec{a} = 0 \text{ und } \vec{c} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{a}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Kreuzprodukt

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 \cdot b_3 - a_3 \cdot b_2 \\ a_3 \cdot b_1 - a_1 \cdot b_3 \\ a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1 \end{pmatrix}$$

Diagram illustrating the calculation of the cross product using the determinant method. The components a_1, a_2, a_3 and b_1, b_2, b_3 are arranged in two columns. Red lines connect a_2 to b_3 and a_3 to b_2 , with a minus sign between them. Blue lines connect a_3 to b_1 and a_1 to b_3 . Green lines connect a_1 to b_2 and a_2 to b_1 .

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \vec{a} \times \vec{b} = ?$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Kreuzprodukt

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 \cdot b_3 - a_3 \cdot b_2 \\ a_3 \cdot b_1 - a_1 \cdot b_3 \\ a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1 \end{pmatrix}$$

The diagram shows the components of the vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ with colored lines indicating the calculation of each component of the cross product: red lines for the first component, blue for the second, and green for the third.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \vec{a} \times \vec{b} = ?$$

Lösung

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 - 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 - 3 \cdot 0 \\ 3 \cdot 2 - 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Spatprodukt

Definition: Spatprodukt

Für drei Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ ist das **Spatprodukt** $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$ definiert als

$$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$$

Geometrisch:

$|\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}|$ ^{Betrag in $\mathbb{R}$} gibt das Volumen des Spats (oder Parallelepipeds) an, das von den drei Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ und $\vec{c}$ aufgespannt wird:

$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}$ und $\vec{c}$ sind **koplanar** (liegen in einer gemeinsamen Ebene)

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Spatprodukt

Aufgabe: Einen Spat nennt man einen Körper, der von drei Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ aufgespannt wird. Das Volumen V des Spates kann durch die Formel

$$V = | \langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{w} \rangle |$$

berechnet werden. Berechnen Sie das Volumen des Spates, der von den Vektoren

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

aufgespannt wird.

Lösung: Es gilt

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Für das Volumen folgt $V = |0 - 4 - 5| = 9$.

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Aufgaben - Geometrische Berechnung mit Hilfe von Vektoren

- a) Berechnen Sie den Betrag des Vektors $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ und normieren Sie den Vektor, d.h. bestimmen Sie den Einheitsvektor $\vec{a}_0$ in Richtung von $\vec{a}$.
- b) Der Vektor $\vec{a}$ wird vom Punkt $P(3|2|1)$ abgetragen. Welche Koordinaten besitzt der Endpunkt Q ?
- c) Wie groß ist der Winkel zwischen den Vektoren $\vec{OP}$ und $\vec{OQ}$ in b)?
- d) Bestimmen Sie die Winkel, welche der Vektor $\vec{a}$ in a) mit den drei positiven Koordinatenachsen einschließt.

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Aufgaben - Geometrische Berechnung mit Hilfe von Vektoren

- a) Berechnen Sie den Betrag des Vektors $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ und normieren sie den Vektor, d.h. bestimmen Sie den Einheitsvektor $\vec{a}_0$ in Richtung von $\vec{a}$.

Lösung:

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

Innovative
Hochschule

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Aufgaben - Geometrische Berechnung mit Hilfe von Vektoren

- a) Berechnen Sie den Betrag des Vektors $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ und normieren sie den Vektor, d.h. bestimmen Sie den Einheitsvektor $\vec{a}_0$ in Richtung von $\vec{a}$.

Lösung:

$$a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

$$\text{Damit ist } a = \sqrt{2^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{29} = 5,39.$$

Der Einheitsvektor $\vec{a}_0$ in Richtung $\vec{a}$ errechnet

$$\text{sich zu } \vec{a}_0 = \frac{1}{\sqrt{29}} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,371 \\ 0,743 \\ 0,557 \end{pmatrix}.$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Aufgaben - Geometrische Berechnung mit Hilfe von Vektoren

- b) Der Vektor $\vec{a}$ wird vom Punkt $P(3|2|1)$ abgetragen. Welche Koordinaten besitzt der Endpunkt Q ?

Lösung:

Wie bei zweidimensionalen Vektoren gilt: $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$.

**Hochschule
Flensburg**
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Aufgaben - Geometrische Berechnung mit Hilfe von Vektoren

- b) Der Vektor $\vec{a}$ wird vom Punkt $P(3|2|1)$ abgetragen. Welche Koordinaten besitzt der Endpunkt Q ?

Lösung:

$$\text{Wie bei zweidimensionalen Vektoren gilt: } \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- c) Wie groß ist der Winkel zwischen den Vektoren $\overrightarrow{OP}$ und $\overrightarrow{OQ}$ in b)?

Lösung:

Der Winkel berechnet sich wie bei zweidimensionalen Vektoren mithilfe des Skalarprodukts. Die **Koordinatenform des Skalarprodukts** lautet nun:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z.$$

$$|\overrightarrow{OP}| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{14}; \quad |\overrightarrow{OQ}| = \sqrt{5^2 + 6^2 + 4^2} = \sqrt{77};$$

$$\cos \varphi = \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}}{|\overrightarrow{OP}| \cdot |\overrightarrow{OQ}|} = \frac{31}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{77}} = 0,944 \Rightarrow \varphi = \arccos 0,944 = 19,2^\circ.$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

Innovative
Hochschule

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern

13.2 Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Aufgaben - Geometrische Berechnung mit Hilfe von Vektoren

- d) Bestimmen Sie die Winkel, welche der Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ mit den drei positiven Koordinatenachsen einschließt.

Lösung: aus Teil a) folgt: $|\vec{a}| = \sqrt{29}$

Bemerkung: Oft sind die drei Winkel α, β, γ eines Vektors $\vec{a}$ zu den *positiven* Koordinatenachsen gegeben, so folgt für die Koordinaten (skalaren Komponenten):

$$a_x = |\vec{a}| \cdot \cos \alpha$$

$$a_y = |\vec{a}| \cdot \cos \beta$$

$$a_z = |\vec{a}| \cdot \cos \gamma$$

Hochschule
Flensburg
University of
Applied Sciences

ausgezeichnet als:

**Innovative
Hochschule**

Eine gemeinsame Initiative
von Bund und Ländern